

Annexe : Explication des dénominations de colonnes

N°GLEM	Numéro du groupe local d'évaluation médicale
remboursement	Acte ou forfait
province	Province
code postal	Code postal
ville	Ville
nb de médecins généralistes	Nombre de médecins généralistes
nb patients	Nombre de patients
% femmes	Pourcentage de femmes
% < 15	Pourcentage de patients de moins de 15 ans
% > 75	Pourcentage de patients de plus de 75 ans
% BIM	Pourcentage de patients bénéficiaires de l'intervention majorée
% chroniques	Pourcentage de malades chroniques
vaccination grippe	Pourcentage de patients de 65 ans et plus qui ont été vaccinés contre la grippe dans le courant de l'année
% AB < 15	Pourcentage de patients avec ≥ 1 prescription d'antibiotiques dans le courant de l'année (1-14 ans)
% AB > 15	Pourcentage de patients avec ≥ 1 prescription d'antibiotiques dans le courant de l'année (≥ 15 ans)
% 2nd ligne AB < 15	Pourcentage d'antibiotiques de deuxième ligne (amoxicilline associée à l'aide clavulanique, céphalosporines, quinolones, macrolides) (1-14 ans)
% 2nd ligne AB > 15	Pourcentage d'antibiotiques de deuxième ligne (amoxicilline associée à l'aide clavulanique, céphalosporines, quinolones, macrolides) (≥ 15 ans)
% amoxicilline < 15	Pourcentage de prescriptions d'amoxicilline, non combinée à de l'acide clavulanique (1-14 ans)
% amoxicilline > 15	Pourcentage de prescriptions d'amoxicilline, non combinée à de l'acide clavulanique (≥ 15 ans)
% nitrofuranes < 15	Pourcentage de nitrofuranes dans le traitement d'une infection des voies urinaires (15-64 ans)
% nitrofuranes > 15	Pourcentage de nitrofuranes dans le traitement d'une infection des voies urinaires (≥ 65 ans)
% polymédication	Pourcentage de patients de 65 ans et plus avec une consommation de longue durée de ≥ 5 médicaments différents
% hypolipidem. > 80	Pourcentage de patients de 80 ans et plus qui sont traités par médicaments hypolipémiants
% hypolipidem. > 80 (init)	Pourcentage de patients de 80 ans et plus qui entament un traitement par médicaments hypolipémiants
% 65 avec AINS > 30j	Pourcentage de patients de 65 ans et plus ayant une prescription d'AINS pour plus de 30 jours
% anticholinergiques > 75	Pourcentage de patients de 75 ans et plus ayant une prescription pour plus de 80 jours d'au moins un médicament à action anticholinergique

% antidépresseurs 15-64	Pourcentage de patients avec une prescription d'antidépresseurs (15-64 ans)
% antidépresseurs > 64	Pourcentage de patients avec une prescription d'antidépresseurs (≥ 65 ans)
% antidépresseurs 15-64 (sans trazodone)	Pourcentage de patients avec une prescription d'antidépresseurs (à l'exclusion de la trazodone) (15-64 ans)
% antidépresseurs > 64 (sans trazodone)	Pourcentage de patients avec une prescription d'antidépresseurs (à l'exclusion de la trazodone) (≥ 65 ans)
% antipsychotique > 75	Pourcentage de patients de 75 ans et plus avec une prescription d'antipsychotiques
% statines diabétiques > 50	Prescription de statines à des patients diabétiques présentant un risque cardiovasculaire accru
% IPP 40-64	Pourcentage de patients de 40-64 ans ayant une prescription d'IPP pour plus de 80 jours
% 40-49 sans risque CV avec statines	Pourcentage de patients de 40-49 ans sans risque cardiovasculaire identifié qui ont reçu une prescription de médicaments hypolipidémisants
% 65 dépistage diabète	Proportion de personnes de plus de 65 ans qui bénéficient chaque année d'un dépistage du diabète sucré
test thyroïde inutiles	Proportion de patients qui ont subi un dépistage inapproprié de la fonction thyroïdienne
combinaison T3-T4	Surconsommation de dosage combiné T4-T3 lors du dépistage d'un trouble de la fonction thyroïdienne
% 25-64 dépistage cancer col	Proportion de femmes de 25-64 ans qui ont bénéficié d'un dépistage du cancer du col de l'utérus
% nouveau HTA avec créatinine	Proportion de nouveaux consommateurs d'antihypertenseurs avec un démarrage adéquat (c.-à-d. avec un dosage récent de la créatinine)
% 45-65 avec tests superflus	Proportion de patients sains de 45-65 ans qui ont subi ≥1 bilan biochimique général inapproprié
nb moyen de tests labo superflus	Nombre moyen de tests biochimiques obsolètes réalisés par patient
tests hormonaux F 45-65	Proportion de patientes saines de 45-65 ans qui ont subi ≥1 test hormonal inapproprié
ID: glycémie / 3 mois	Proportion de patients ID avec un dosage du glucose à jeun tous les 3 mois
ID: HbA1c / 6 mois	Proportion de patients ID avec un dosage HbA1c tous les 6 mois
ID: protéinurie / 12 mois	Proportion de patients ID avec un dosage annuel de protéinurie/microalbuminurie
ID: bilan lipide / 12 mois	Proportion de patients ID avec un dosage annuel du bilan lipidique
ID: ophtalmo / 12 mois	Proportion de patients ID avec un contrôle ophtalmologique annuel
NID: glycémie / 3 mois	Proportion de patients NID avec un dosage du glucose à jeun tous les 3 mois

NID: HbA1c / 6 mois	Proportion de patients NID avec un dosage HbA1c tous les 6 mois
NID: protéinurie / 12 mois	Proportion de patients NID avec un dosage annuel de protéinurie/microalbuminurie
NID: bilan lipide / 12 mois	Proportion de patients NID avec un dosage annuel du bilan lipidique
NID: ophtalmo / 12 mois	Proportion de patients NID avec un contrôle ophtalmologique annuel
TSH / 12 mois chez hypothyroïdie	Proportion de patients avec une hypothyroïdie connue et avec un suivi biochimique correct ($\geq 1x/an$ TSH)
créatinine /12 mois chez HTA	Proportion de patients qui prennent des IECA, des sartans ou des diurétiques, avec un suivi biomédical correct ($\geq 1x/an$ créatinine)
% imagerie colonne / 36 mois	Proportion de vos patients sans problème orthopédique avéré, à qui vous avez prescrit au moins 1 fois une imagerie de la colonne vertébrale au cours des 3 dernières années
nb moyen imagerie / patient	Nombre moyen d'exams d'imagerie médicale de la colonne vertébrale, par patient
% RX,CT / imagerie colonne	Ratio de RX et de CT dans les prescriptions d'imagerie médicale de la colonne vertébrale
% préop < 50	Proportion de patients < 50 ans avec un profil de risque faible qui ont subi des examens préopératoires inappropriés en cas de petite chirurgie ou de chirurgie intermédiaire
% préop > 50	Proportion de patients ≥ 50 ans avec un profil de risque faible qui ont subi des examens préopératoires inappropriés en cas de petite chirurgie ou de chirurgie intermédiaire
msv imagerie obsolete	Exposition aux rayonnements (en mSv) causés par une imagerie médicale obsolète, par patient
% colonne / obsolete	Proportion d'exposition à des rayonnements qui sont causés par des RX colonne vertébrale et CT colonne vertébrale
% echo thyroïde 36 mois	Proportion de patients avec un trouble de la fonction thyroïdienne connu qui ont subi ≥ 1 suivi échographique inapproprié au cours des 3 dernières années
% test mammo 50-69 sur 24 mois	Proportion de femmes dans la population cible du dépistage (50-69 ans), qui ont subi un dépistage biennal
% test mammo organisé 50-69	Proportion de dépistages dans la population cible (50-69 ans) qui ont été réalisés via le système de dépistage organisé (=étude de la population) (sur l'ensemble des dépistages réalisés)

L'explication complète d'un indicateur est disponible dans le feedback des médecins généralistes et sur notre site internet:

<https://www.inami.fgov.be/fr/professionnels/sante/medecins/qualite/feedback/Pages/rapport-activite-medecin-generaliste-2016.aspx>